MEDICI CON L'AFRICA CUAMM



PIANO STRATEGICO 2008-2015

RAFFORZARE I SISTEMI SANITARI:
IL CONTRIBUTO DI MEDICI CON L'AFRICA CUAMM
ALLA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO
ALLA SALUTE PER I POVERI NEL CONTESTO
DELL'AGENDA DEL MILLENNIO

MEDICI CON L'AFRIGA CUAMM

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM



- 7 Paesi
- 92 Persone
- 36 Progetti
- 14 Ospedali
- 14 Distretti
- 6 Scuole infermiere
- 3 Università

DOCTORS WITH AFRICA
CUAMM

ANGOLA



MEDICI CON L'AFRICA
CUAMM

Diagnosi

21 Marzo 2005

I test di laboratorio del Center for Disease Control and prevention (CDC, Atlanta) hanno identificato il virus di Marburg come l'agente causale in un focolaio di sospetta febbre emorragica virale in Angola. Il virus è stato identificato in nove campioni su dodici prelevati da casi fatali. L'analisi retrospettiva ha identificato 102 casi nel focolaio, che data dall'Ottobre 2004. Di questi casi, 95 sono stati fatali.

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM



Maggio 2005

Nella Provincia di Uige, nel Nord dell'Angola, un focolaio di febbre emorragica di Marburg inizia ad essere controllato. Più di 300 persone sono decedute, ma il numero di nuovi casi è diminuito considerevolmente dopo il picco del mese di Aprile.

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM



Nella città di Uige e nelle comunità rurali circostanti centinaia di persone sono morte di febbre emorragica Marburg, una rara malattia altamente letale simile alla febbre emorragica Ebola.

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM

La malattia si è diffusa particolarmente tra le persone esposte al virus Marburg durante l'assistenza a casa o ai funerali, tramite contatto con i fluidi corporei di coloro che sono morti per la malattia.

Anche la pratica pericolosa di iniezioni a casa è stata identificata come una causa maggiore di diffusione del focolaio.

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM



MEDICI
CON L'AFRICA
CUAMM



La donna e suo figlio sono tenuti nel reparto di isolamento all'Ospedale Provinciale di Uige in attesa del risultato del test di laboratorio.
Buone notizie: entrambe sono negativi.

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM



Nel reparto di isolamento all'Ospedale provinciale di Uige un medico assiste una paziente che ha il virus di Marburg. La letalità del Marbur è estremamente elevata — e quasi tutti i pazienti muoiono 8-9 giorni dopo l'inizio dei sintomi..

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM



MEDICI
CON L'AFRICA
CUAMM



Nei focolai di febbre emorragiche virali, inclusi quelli causati dal virus marburg, una esposizione ai cadaveri senza protezioni è una causa importante di ulteriore diffusione. Qui team mobile a Uige prepara il trasporto e la sepoltura sicura dei casi fatali di febbre emorragica Marburg.

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM



MEDICI
CON L'AFRICA
CUAMM



MEDICI
CON L'AFRICA
CUAMM



MEDICI
CON L'AFRICA
CUAMM